

Você sabe que este hospital está participando da Campanha Sobrevivendo a Sepse?

**FAÇA SUA PARTE!!!**

**PARTICIPE CONOSCO DO COMBATE A DOENÇA.**

Fique atento aos sinais clínicos da sepse grave

TAQUICARDIA  
TAQUIPNEIA  
LEUCOCITOSE/LEUCOPENIA  
FEBRE/HIPOTERMIA

FOCO INFECCIOSO  
SUSPEITO



**DISFUNÇÃO ORGÂNICA**

hipotensão, hipoxemia, oligúria, rebaixamento de consciencia, plaquetopenia, hiperlactatemia

Comunique imediatamente o médico

Administre o antibiótico o mais rápido possível.  
Cada hora de atraso evitada representa VIDA!

**SUA CONDOTA PODE SALVAR VIDAS**

Você sabe que este hospital está participando da Campanha Sobrevivendo a Sepse?

**FAÇA SUA PARTE!!!**

**PARTICIPE CONOSCO DO COMBATE A DOENÇA.**

Fique atento aos sinais clínicos da sepse grave

TAQUICARDIA  
TAQUIPNEIA  
LEUCOCITOSE/LEUCOPENIA  
FEBRE/HIPOTERMIA

FOCO INFECCIOSO  
SUSPEITO



**DISFUNÇÃO ORGÂNICA**

hipotensão, hipoxemia, oligúria, rebaixamento de consciencia, plaquetopenia, hiperlactatemia

Comunique imediatamente o médico

Administre o antibiótico o mais rápido possível.  
Cada hora de atraso evitada representa VIDA!

**SUA CONDOTA PODE SALVAR VIDAS**

**SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE**

Você sabe que este hospital está participando da Campanha Sobrevivendo a Sepse?

**FAÇA SUA PARTE!!!**

**PARTICIPE CONOSCO DO COMBATE A DOENÇA.**

Fique atento aos sinais clínicos da sepse grave

TAQUICARDIA  
TAQUIPNEIA  
LEUCOCITOSE/LEUCOPENIA  
FEBRE/HIPOTERMIA

FOCO INFECCIOSO  
SUSPEITO



**DISFUNÇÃO ORGÂNICA**

hipotensão, hipoxemia, oligúria, rebaixamento de consciencia, plaquetopenia, hiperlactatemia

Comunique imediatamente o médico

Administre o antibiótico o mais rápido possível.  
Cada hora de atraso evitada representa VIDA!

**SUA CONDOTA PODE SALVAR VIDAS**

Você sabe que este hospital está participando da Campanha Sobrevivendo a Sepse?

**FAÇA SUA PARTE!!!**

**PARTICIPE CONOSCO DO COMBATE A DOENÇA.**

Fique atento aos sinais clínicos da sepse grave

TAQUICARDIA  
TAQUIPNEIA  
LEUCOCITOSE/LEUCOPENIA  
FEBRE/HIPOTERMIA

FOCO INFECCIOSO  
SUSPEITO



**DISFUNÇÃO ORGÂNICA**

hipotensão, hipoxemia, oligúria, rebaixamento de consciencia, plaquetopenia, hiperlactatemia

Comunique imediatamente o médico

Administre o antibiótico o mais rápido possível.  
Cada hora de atraso evitada representa VIDA!

**SUA CONDOTA PODE SALVAR VIDAS**

**SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE SEPSE**