

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado Dr.(a) _____

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente _____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na implementação do protocolo gerenciado de sepse, com base nas diretrizes da Campanha Mundial de Sobrevivência a Sepse, procurando otimizar a nosso atendimento.

Por isso, segue abaixo a aderência às medidas preconizadas que você obteve com relação a esse paciente nas seis primeiras horas do atendimento.

<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Colhido lactato sérico
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Colhido hemocultura antes do antibiótico
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Administrado antibiótico antes de uma hora
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se lactato $\geq 2 \times$ VN, administrado 30 ml/kg de cristalóide
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se manteve hipotensão após cristalóides, iniciado noradrenalina
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se lactato alterado ou uso de vasopressor, passado acesso central
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Otimizada PVC > 8 mmHg ou 12 mmHg se VM
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Obtida SvO ₂ acima de 70%

NA – não se aplica

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,

Grupo de sepse

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado Dr.(a) _____

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente _____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na implementação do protocolo gerenciado de sepse, com base nas diretrizes da Campanha Mundial de Sobrevivência a Sepse, procurando otimizar a nosso atendimento.

Por isso, segue abaixo a aderência às medidas preconizadas que você obteve com relação a esse paciente nas seis primeiras horas do atendimento.

<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Colhido lactato sérico
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Colhido hemocultura antes do antibiótico
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	Administrado antibiótico antes de uma hora
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se lactato $\geq 2 \times$ VN, administrado 30 ml/kg de cristalóide
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se manteve hipotensão após cristalóides, iniciado noradrenalina
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Se lactato alterado ou uso de vasopressor, passado acesso central
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Otimizada PVC > 8 mmHg ou 12 mmHg se VM
<input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não <input type="checkbox"/> NA	Obtida SvO ₂ acima de 70%

NA – não se aplica

Precisamos melhorar, você não acha?

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,

Grupo de sepse