

Campanha de Sobrevivência a Sepse  
CHECK-LIST

Data/hora do diagnóstico médico de sepse grave ou choque séptico: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

- ( ) Colhido lactato arterial sérico      Data/hora coleta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_
- ( ) Colhido duas hemoculturas      Data/hora coleta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_
- ( ) Administrado antibiótico intravenoso      Data/hora prescrição: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_  
adequado      Liberação farmácia: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_  
Administração: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_
- ( ) Checado lactato sérico    Valor: \_\_\_\_\_    Data/hora checagem: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_
- ( ) Se lactato alterado ( $\geq 2$  x valor normal), administrado 30 mL/kg de cristalóides
- ( ) Se hipotensão, administrado 30 mL/kg de cristalóides
- ( ) Se manteve hipotensão imediatamente após item anterior, iniciado noradrenalina

Data/hora de início do vasopressor: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_

- ( ) Se lactato alterado ( $\geq 2$  x valor normal), coletada nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica  
Valor: \_\_\_\_\_      Data/hora coleta: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    \_\_\_:\_\_\_
- ( ) Se hipotensão e/ou hiperlactatemia, foi avaliado o *status* volêmico e perfusão nas primeiras 6 horas?

Considere avaliação se houver registro médico sobre:

- ( ) Mensuração de PVC
- ( ) Variação de pressão de pulso
- ( ) Variação de distensibilidade de cava
- ( ) Elevação passiva de membros inferiores
- ( ) Qualquer outra forma de responsividade a fluídos
- ( ) Mensuração de SvO<sub>2</sub>
- ( ) Tempo de enchimento capilar
- ( ) Intensidade de livedo
- ( ) Sinais indiretos como melhora do nível de consciência

Data e hora do registro no prontuário dessa avaliação: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ às \_\_\_:\_\_\_

**PARABÉNS!!**

**O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!**