

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado(a) _____.

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente _____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na Campanha de Sobrevivência a Sepse, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em sepse na nossa instituição. Por isso, segue abaixo a avaliação de aderência aos nossos indicadores das seis primeiras horas do atendimento a esse paciente.

Você e sua equipe foram fundamentais para o alcance desses resultados.

- () sim () não - Colhido lactato sérico
- () sim () não - Colhido hemocultura antes do antibiótico
- () sim () não - Administrado antibiótico antes de uma hora
- () sim () não - Se lactato duas vezes o valor normal, administrado 30ml/Kg de cristalóide em 30 minutos
- () sim () não - Se hipotensão, administrado 30 ml/kg de cristalóide em 30 minutos
- () sim () não - Se manteve hipotensão imediatamente após ítem anterior iniciado vasopressor
- () sim () não - Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletado nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica
- () sim () não - Foi avaliado o *status* volêmico e perfusão dos pacientes hipotensos e/ou hiperlactatêmicos nas primeiras 6 horas?

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,

Protocolo sepse

PROTOCOLO GERENCIADO DE SEPSE

Prezado(a) _____.

No dia _____ você deu o primeiro atendimento ao paciente _____ em quem foi feito o diagnóstico de sepse grave.

Como você sabe, estamos envolvidos na Campanha de Sobrevivência a Sepse, procurando otimizar o atendimento prestado ao doente em sepse na nossa instituição. Por isso, segue abaixo a avaliação de aderência aos nossos indicadores das seis primeiras horas do atendimento a esse paciente.

Você e sua equipe foram fundamentais para o alcance desses resultados.

- sim não - Colhido lactato sérico
- sim não - Colhido hemocultura antes do antibiótico
- sim não - Administrado antibiótico antes de uma hora
- sim não - Se lactato duas vezes o valor normal, administrado 30ml/Kg de cristalóide em 30 minutos
- sim não - Se hipotensão, administrado 30 ml/kg de cristalóide em 30 minutos
- sim não - Se manteve hipotensão imediatamente após ítem anterior iniciado vasopressor
- sim não - Se lactato alterado (≥ 2 x valor normal), coletado nova amostra de lactato arterial após reposição volêmica
- sim não - Foi avaliado o *status* volêmico e perfusão dos pacientes hipotensos e/ou hiperlactatêmicos nas primeiras 6 horas?

PARABÉNS!!

O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos, TODOS devem estar envolvidos para que nosso objetivo seja atingido!

O bom atendimento a nossos pacientes está em suas mãos!!!!

Obrigada,
Protocolo sepse