

# TEMPO É VIDA!

PERANTE SUSPEITA CLÍNICA DE SEPSE GRAVE, SEGUIR OS SEGUINTE PASSOS

**PACOTE 03 HORAS-PASSO 1**  
obrigatório em todos os casos



**PACOTE 03 HORAS-PASSO 2**  
obrigatório em todos os casos



**PACOTE 03/06 HORAS-PASSO 3**  
Se lactato > 2 x o valor normal ou hipotensão  
**OTIMIZAÇÃO HEMODINÂMICA**

**Coletar lactato + hemoculturas + culturas de sítios pertinentes**

- ▶ utilize ROTINA específica para o protocolo sepsis
- ▶ acione o profissional responsável pela coleta\*

**Iniciar antibioticoterapia empírica em 1 hora**


- ▶ consulte o guia da CCIH para a escolha do antimicrobiano
- ▶ prescreva o antibiótico com horário
- ▶ notifique a enfermeira responsável pelo leito para administração imediata

*Tempo ideal máximo para resultado do lactato = 30 min*

\*Colha Kit sepsis – hemocultura, gasometria arterial/lactato, hemograma, creatinina, bilirrubinas, coagulograma.

*Caso seja comprovado posteriormente não se tratar de sepsis, sempre poderemos suspender a antibioticoterapia*

## PASSO 3 - OTIMIZAÇÃO HEMODINÂMICA



## PACOTE 06 HORAS-PASSO 4 - OTIMIZAÇÃO DE SVC<sub>O</sub><sub>2</sub> / PVC - (Puncionar acesso venoso central)

*Em pacientes com lactato alterado, deve-se procurar sua normalização*

