

FICHA DE TRIAGEM – Campanha Sobrevivendo a Sepse

LOCAL DE INTERNAÇÃO: _____	DADOS DO PACIENTE: Nome completo: _____ Idade: _____ RH: _____ Leito: _____
--	--

ENFERMAGEM – PACIENTE APRESENTA UM OU MAIS DOS SINAIS DE SIRS?

Hipertermia > 37,8° C ou hipotermia <35° C (opcionalmente, pode ser retirado para aumentar a especificidade)
 Leucocitose > 12000, leucopenia <4000 ou desvio esquerdo > 10% (opcionalmente, pode ser retirado)
 Taquicardia > 90 bpm (opcionalmente, o limite pode ser aumentado para 100 ou 110 para aumentar a especificidade)
 Taquipnéia > 20 ipm

OU UM DOS CRITÉRIOS DE DISFUNÇÃO ORGÂNICA ABAIXO?

Oligúria
 Hipotensão
 Rebaixamento do nível de consciência
 Dispnéia ou dessaturação

Acionamento equipe médica: Nome do médico chamado _____ Hora: ____:____

AValiação Médica 1 – Paciente apresenta historia sugestiva de infecção?

<input type="checkbox"/> Pneumonia/Empiema	<input type="checkbox"/> Infecção de prótese
<input type="checkbox"/> Infecção urinária	<input type="checkbox"/> Infecção óssea/articular
<input type="checkbox"/> Infecção abdominal aguda	<input type="checkbox"/> Infecção de ferida operatória
<input type="checkbox"/> Meningite	<input type="checkbox"/> Infecção de corrente sanguínea associada ao cateter
<input type="checkbox"/> Endocardite	<input type="checkbox"/> Sem foco definido
<input type="checkbox"/> Pele e partes moles	<input type="checkbox"/> Outras infecções: _____

AValiação Médica 2 – O paciente apresenta critérios para:

Sepse (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames para descartar disfunção orgânica laboratorial)
 Sepse grave
 Choque séptico
 Afastado sepse/sepse grave/choque séptico
 Sepse grave/choque séptico em cuidados de fim de vida sem conduta no momento

CONDUTA MÉDICA:

coletar exames do kit sepse E Data e hora da coleta: __/__/__ às __: __
 prescrever antibioticoterapia OU Data e hora da primeira dose: __/__/__ às __: __
 encerrar o atendimento Data e hora do atendimento médico: __/__/__ às __: __

AValiação Médica 3 – APÓS EXAMES, há novas disfunções orgânicas? () NÃO

Paciente não tinha disfunção orgânica, somente sepse
 PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg
 Relação PaO₂/FiO₂ <300 ou necessidade de O₂ para manter SpO₂ > 90
 Rebaixamento do nível de consciência
 Creatinina > 2,0 mg/dL ou diurese menor que 0,5mL/Kg/h nas últimas 2 horas
 Bilirrubina > 2mg/dL
 Contagem de plaquetas < 100.000mm³
 Lactato acima do valor de referência
 Coagulopatia (INR > 1,5 ou TTPA > 60 seg)

Data e hora da primeira disfunção orgânica: __/__/__ às __: __

O caso ficou confirmado como: () Sepse () Sepse grave () Sepse grave com lactato alterado () Choque séptico

MÉDICO RESPONSÁVEL: _____ **CRM:** _____

ENFERMEIRO: _____ **COREN:** _____